

Clínica Oftalmològica Reus es dedica al tractament integral mèdic i quirúrgic de les patologies visuals

PATOLOGIES TRACTADES

Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració macular · Despreniment de retina · Oftalmologia pediàtrica · Neurooftalmologia · Cirurgia oculoplàstica · Cirurgia refractiva

El Dr Josep Callizo i Tomàs és el director mèdic de Clínica Oftalmològica Reus, cap de servei d'Oftalmologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i professor titular d'Oftalmologia de la URV.

Què és l'ambliopia o "ull drogo"? És la baixa visió d'un o dels dos ulls per una falta d'ús en el període de desenvolupament visual (fins als 8 anys, aproximadament).

Què pot passar si no es detecta a temps un ull drogo? Com que s'origina a la infància, cal diagnosticar-lo precoçment, sinó la baixa visió de l'ull afectat es perllongarà durant l'edat adulta. En la majoria dels casos el nen es comporta amb total normalitat i l'ambliopia no es detecta fins que es realitza una revisió. És per això imprescindible una revisió de l'estat visual del nen/a per part d'un oftalmòleg abans dels 4 anys d'edat.

Com es tracta l'ambliopia? A Clínica Oftalmològica Reus (COR) tenim una llarga experiència en el tractament de l'ambliopia, consistent en corregir la causa (ull desviat, necessitat de correcció òptica amb ulleres, oclusions, etc). Sovint cal fer una TERÀPIA VISUAL per tal de recuperar la visió de l'ull "drogo" en el nen. A COR disposem dels aparells i el personal tècnic i mèdic especialitzat en aquestes tècniques, que permeten recuperar la visió en la infància.

Quan cal portar el nen a l'oftalmòleg? Si s'apropa molt als objectes per veure'ls, desvia un ull, té les parpelles caigudes o llagimeig constant, cal fer la revisió immediatament. Si no és així, **la primera exploració ocular completa s'hauria de realitzar entre els 3 i 4 anys d'edat, i després anualment.**

